

旅遊防蚊做的好
境外登革熱
沒煩惱



疫情通報專線：0800-024-582
全球資訊網：www.cdc.gov.tw

什麼是「登革熱」

有人叫它做「天狗熱」或是「斷骨熱」。

它是一種藉由病媒蚊叮咬人而傳播的急性傳染病！但是不會經由人直接傳染給人。

傳播登革熱的病媒蚊

台灣傳播登革熱病毒的病媒蚊主要為埃及斑蚊和白線斑蚊。



白線斑蚊
最喜歡叮咬人的高峰期為日出後1-2小時及日落前2-3小時。

埃及斑蚊

主要棲息在住家戶內，喜歡叮咬人的高峰期不明顯。



登革熱傳染途徑

帶病毒斑蚊
埃及斑蚊
白線斑蚊



斑蚊叮咬
登革熱患者

病毒於病媒蚊
體內大量繁殖
約8-12天後
可傳給
健康人

人感染病毒約
3-8天潛伏期



開始生病
(發病前一天至第五天
為病毒血症期)



健康人

典型登革熱臨床症狀

發燒 (38°C以上)

骨頭關節肌肉痛

後眼窩痛

發燒 3-4天後皮膚會出現紅疹

紅疹

後眼窩痛



骨頭關節
肌肉痛

發燒
38°C以上

旅遊防蚊祕笈

穿著淺色長袖衣褲

避免蚊蟲叮咬

身體裸露處

塗抹防蚊藥品

回國後若有

發燒、骨頭關節

肌肉及後眼窩痛

紅疹等症狀

應儘速就醫

並主動告知

旅遊行程

